

核准日期：2009 年 9 月 22 日
修订日期：2019 年 12 月 01 日



保泰松片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：保泰松片

英文名称：Phenylbutazone Tablets


汉语拼音：Baotaisong Pian

【成份】

本品主要成份为保泰松。

化学名称：1,2-二苯基-4-正丁基吡唑烷-3,5-二酮。

化学结构式：



分子式：C₁₉H₂₀N₂O₂

分子量：308.38

【性状】本品为糖衣片，除去糖衣后显白色。

【适应症】主要用于治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎。本药大剂量可减少肾小管对尿酸盐的再吸收，促进尿酸盐排泄，故可用于治疗急性痛风。

【规格】 0.1g

【用法用量】 治疗关节炎 口服：每次 0.1-0.2g，每日 3 次，饭后服。每日总量不宜超过 0.8g。一周后如无不良反应，病情改善可继续服用，剂量应递减至维持量：每次 0.1-0.2g，每日一次。 急性痛风 口服：初量 0.2-0.4g，以后每 6 小时 0.1-0.2g。症状好转后减为每次 0.1g，每日三次，连服三日。

【不良反应】 1.常见不良反应有恶心、呕吐、胃肠道不适、水钠潴留、水肿、皮疹等；2.也可引起腹泻、眩晕、头痛、长期大剂量致消化道溃疡及胃肠出血；3.偶有引起肝炎、黄疸、肾炎、血尿、剥脱性皮炎、多型性红斑、甲状腺肿、粒细胞及血小板缺乏症；4.服药一周以上应检查血象。如出现发热、咽痛、皮疹、黄疸及柏油样大便应即停药。

【禁忌】对阿司匹林过敏者，有溃疡病史，水肿，高血压、精神病、癫痫、支气管哮喘、心脏病及肝、肾功能不良者禁用。

【注意事项】 1.用药时宜忌盐；2.服药期间应检查血象，监测、肾功能；3.本品不宜长期服用，超过一周应检查血象；

【孕妇及哺乳期妇女用药】 孕妇禁用。

【儿童用药】 儿童对本品敏感，故忌用。

【老年用药】 老年患者慎用。

【药物相互作用】 1.本品能抑制香豆素类抗凝药和磺酰脲类降糖药的代谢，并可

将其从血浆蛋白结合部位置换出来，从而明显增强其作用及毒性，可引起血糖过低或出血症状。与增加肝微粒体酶活性的药物合用可减少本药的消除半衰期。2. 应避免与其他具有骨髓抑制作用的药物合用。3. 本品与利尿剂氨苯蝶啶合用可引起肾功能损害。

【药物过量】尚不明确。

【药理毒理】本品为非甾体抗炎药，有较强的抗炎作用，对炎性疼痛效果较好，有促进尿酸排泄作用，解热作用较弱。

【药代动力学】 胃肠道易吸收，血浓度峰值约 2 小时。Vd 为 120ml/kg，剂量增加血药浓度不增加。98%与血浆蛋白结合。主要在肝脏经氧化缓慢代谢，代谢物之一羟基保泰松仍有抗炎活性。本品代谢和排泄均较慢，平均消除半衰期约 70 小时。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【包装】口服固体药用高密度聚乙烯瓶，100 片/瓶。

【有效期】24 个月

【执行标准】卫生部药品标准（二部）第五册。

【批准文号】国药准字 H41024340

【上市许可持有人】海南制药厂有限公司制药二厂

【地 址】林州市史家河工业园区

【生产企业】

企业名称：海南制药厂有限公司制药二厂

生产地址：林州市史家河工业园区

邮政编码：456592

电话号码：0372-6515111

传真号码：0372-6515111