



对乙酰氨基酚片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：对乙酰氨基酚片

英文名称：Paracetamol Tablets

汉语拼音：Duiyixiananjifen Pian

【成份】 本品每片含对乙酰氨基酚 0.3 克。辅料为预胶化淀粉、低取代羟丙纤维素、蔗糖、十二烷基硫酸钠、硫脲、二氧化硅、硬脂酸镁、羧甲淀粉钠。

【性状】 本品为白色片。

【作用类别】 本品为解热镇痛类非处方药药品。

【适应症】 用于普通感冒或流行性感引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

【规格】 0.3 克

【用法用量】 口服。4~6 岁儿童，一次 0.5 片；7~12 岁儿童，一次 1 片，12 岁以上儿童及成人一次 1~2 片，若持续发热或疼痛，可间隔 4-6 小时重复用药一次，24 小时内不得超过 4 次。

【不良反应】 1. 偶见皮疹、荨麻疹、药热及粒细胞减少。2. 长期大量用药会导致肝肾功异常。3. 偶见皮疹。有报道，极少数患者使用对乙酰氨基酚可能出现致命的、严重的皮肤不良反应。4. 过量使用对乙酰氨基酚可引起严重肝损伤。

【禁忌】 1. 严重肝肾功不全者禁用。2. 对本品过敏者禁用。

【注意事项】 1. 本品为对症治疗药，用于解热连续使用不超过3天，用于止痛不超过5天，症状未缓解请咨询医师或药师。2. 对阿司匹林过敏者慎用。3. 不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。4. 肝肾功不全者慎用。5. 孕妇及哺乳期妇女慎用。6. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。7. 过敏体质者慎用，对本品过敏者禁用。8. 本品性状发生改变时禁止使用。9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。10. 儿童必须在成人监护下使用。11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。12. 当出现皮疹或过敏反应的其他征象时，如用药后出现瘙痒、皮疹，尤其出现口腔、眼、外生殖器红斑、糜烂等，应立即停药并咨询医生。13. 因过量使用对乙酰氨基酚有引起严重肝损伤的报道，应严格按说明书使用。用药期间如发现肝生化指标异常或出现全身乏力、食欲不振、厌油、恶心、上腹胀痛、尿黄、目黄、皮肤黄染等可能与肝损伤有关的临床表现时，应立即停药并就医。建议对乙酰氨基酚口服一日最大量不超过 2 克。14. 应尽量避免合并使用含有对乙酰氨基酚或其他解热镇痛药的药品，以避免药物过量或导致毒性协同作用。

【药物相互作用】 1.应用巴比妥类（如苯巴比妥）或解痉药（如颠茄）的患者，长期应用本品可致肝损害。2.本品与氯霉素同服，可增强后者的毒性。3.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】 本品能抑制前列腺素的合成，具有解热、镇痛作用。

【贮藏】 密封保存。

【包装】 口服固体药用高密度聚乙烯瓶，100片/瓶，1000片/瓶。

【有效期】 24个月。

【执行标准】 中国药典2020年版第一增补本。

【批准文号】 国药准字H41021762

【上市许可持有人】 海南制药厂有限公司制药二厂

【地 址】 林州市史家河工业园区

【说明书修订日期】 2024年03月12日

【生产企业】

企业名称：海南制药厂有限公司制药二厂

生产地址：林州市史家河工业园区

邮政编码：456592

电话号码：0372—6515111

传真号码：0372—6515111

如有问题可与生产企业联系