

核准日期：2010 年 02 月 20 日
修订日期：2020 年 12 月 30 日



呋喃唑酮片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【警示语】葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏性患者使用本品容易发生溶血性贫血，禁用于该人群。随着用药时间延长和用药剂量的增加，容易发生不可逆的神经炎；呋喃唑酮可发生严重的皮肤反应，如血清病样荨麻疹等。

【药品名称】

通用名称：呋喃唑酮片


英文名称：FurazolidoneTablets

汉语拼音：FunanzuotongPian

【成份】本品主要成分为呋喃唑酮，

化学名称：3-[[（5-硝基-2-呋喃基）亚甲基]氨基]-2-噁唑烷酮。

化学结构式为：



分子式：C₈H₇N₃O₅

分子量：225.16

【性状】本品为黄色片或糖衣片，除去包衣后显黄色。

【适应症】本品仅用于难以根除的幽门螺旋杆菌感染。

【规格】0.1g

【用法用量】口服。成人常用剂量为一次 0.1g，一日 3-4 次；儿童按体重一日 5-10mg/kg，分 4 次服用。肠道感染疗程为 5-7 日，贾第鞭毛虫病疗程为 7-10 日。

【不良反应】主要有恶心，呕吐、腹泻、头痛、头晕、药物热、皮疹、肛门瘙痒、哮喘、直立性低血压、低血糖、肺浸润等，偶可出现溶血性贫血、黄疸及多发性神经炎。

【禁忌】1、对本品过敏者禁用。2、严禁用于食品和饲料加工。3、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6PD）缺乏者禁用。

【注意事项】1. 一般不宜用于溃疡病或支气管哮喘患者。2. 口服本品期间饮酒，则可引起双硫仑样反应，表现为皮肤潮红、瘙痒、发热、头痛、恶心、腹痛、心动过速、血压升高、胸闷烦躁等，故服药期间和停药后 5 天内，禁止饮酒。3. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6PD）缺乏者可致溶血性贫血。4. 动物实验显示呋喃唑酮对动物有致癌风险，但临床至今未有对人类致癌的病例报道，建议使用时权衡利弊。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【儿童用药】新生儿禁用。14 岁以下儿童禁用。

【老年用药】尚不明确。

【药物相互作用】1. 与三环类抗抑郁药合用可引起急性中毒性精神病，应予避免。

2. 本品可增强左旋多巴的作用。3. 拟交感胺、富含酪胺食物、食欲抑制药、单胺氧化酶抑制剂等可增强本品作用。

【药物过量】1. 一日剂量超过 0.4g 或总量超过 3g 时，可引起精神障碍及多发性神经炎。2. 本品无特异拮抗药，过量时应给予对症处理及支持治疗，包括催吐、洗胃、大量饮水及补液等。

【药理毒理】本品为硝基呋喃类抗菌药。对革兰阳性及阴性菌均有一定抗菌作用，包括沙门菌属、志贺菌属、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、肠杆菌属、金葡菌、粪肠球菌、化脓性链球菌、霍乱弧菌、弯曲菌属、拟杆菌属等，在一定浓度下对毛滴虫、贾第鞭毛虫也有活性。其作用机制为干扰细菌氧化还原酶从而阻断细菌的正常代谢。

【药代动力学】本品口服仅吸收 5%，成人顿服 1g，血药浓度为 1.7-3.3mg/L，但在肠道内保持较高的药物浓度。部分吸收药物随尿排出。

【贮藏】遮光，密封保存。

【包装】口服固体药用高密度聚乙烯瓶，1000 片/瓶。

【有效期】暂定 36 个月。

【执行标准】中国药典 2020 年版二部

【批准文号】国药准字 H20066797

【上市许可持有人】海南制药厂有限公司制药二厂

【地 址】林州市史家河工业园区

【生产企业】

企业名称：海南制药厂有限公司制药二厂

生产地址：林州市史家河工业园区

邮政编码：456592

电话号码：0372-6515111

传真号码：0372-6515111