

核准日期：2010 年 2 月 20 日

修订日期：2019 年 12 月 01 日



肌醇烟酸酯片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：肌醇烟酸酯片


英文名称：Inositol Nicotinate Tablets

汉语拼音：Jichun Yansuanzhi pian

【成份】本品的主要成份为肌醇烟酸酯。

化学名称：1, 2, 3, 5/4, 6 环己六醇尼古丁酸酯。

化学结构式：



分子式：C₄₂H₃₀N₆O₁₂

分子量：810.73

【性状】本品为白色或类白色片。

【适应症】本品用于高脂血症、动脉粥样硬化、各种末梢血管障碍性疾病（如闭塞性动脉硬化症、肢端动脉痉挛症、冻伤、血管性偏头痛等）的辅助治疗。

【规格】0.2g

【用法用量】口服，每日 3 次，一次 0.2-0.6g，连续服用 1—3 个月。

【不良反应】服药后可有轻度恶心、发汗、瘙痒感等反应。

【禁忌】1. 对本品或其它烟酸类药物过敏者禁用。2. 患活动性肝病、不明原因氨基转移酶升高肝功能异常者禁用。3. 活动性溃疡病、有出血倾向者禁用。

【注意事项】胃酸缺乏者应同时服用稀盐酸或柠檬汁以减少不良反应。

【孕妇及哺乳期妇女用药】烟酸可从乳汁中分泌，有可能造成乳儿不良反应，应考虑停药或停止哺乳。

【儿童用药】尚不明确。

【老年用药】老年患者肝、肾功能减退，服用本品应谨慎，应监测肝、肾功能，调整用药剂量。

【药物相互作用】尚不明确。

【药物过量】如发生药物过量，应针对中毒症状采取相应支持疗法。

【药理毒理】本品为一温和的周围血管扩张剂，在体内逐渐水解为烟酸和肌醇，故具有烟酸和肌醇二者的药理作用，具降脂作用。其血管扩张作用较烟酸缓和而持久，没有服用烟酸后的潮红和胃部不适等副作用。本品可选择性的使病变部位

和受寒冷刺激的敏感部位的血管扩张，而对正常血管的扩张作用则较弱。此外并有溶解血栓、抗凝、抗脂肪肝、降低毛细血管脆性等作用。

本品在体内水解为烟酸和肌醇，其中烟酸的 LD₅₀ 为（口服）大鼠 7g/kg，（皮下）大鼠 5g/kg。

【药代动力学】本品烟酸成分经吸收后广泛分布到各组织。约 45 分钟肝内代谢。T_{1/2} 大剂量治疗时，绝大部分经肾排出。

【贮藏】密封，在干燥处保存。

【包装】口服固体药用高密度聚乙烯瓶，100 片/瓶。

【有效期】24 个月

【执行标准】卫生部药品标准化学药品及制剂第一册，WS₁-60-83-89。

【批准文号】国药准字 H41021560

【上市许可持有人】海南制药厂有限公司制药二厂

【地 址】林州市史家河工业园区

【生产企业】

企业名称：海南制药厂有限公司制药二厂

生产地址：林州市史家河工业园区

邮政编码：456592

电话号码：0372-6515111

传真号码：0372-6515111