

核准日期：2007 年 07 月 18 日  
修订日期：2009 年 03 月 03 日  
修订日期：2010 年 10 月 01 日  
修订日期：2015 年 12 月 01 日  
修订日期：2019 年 12 月 01 日  
修订日期：2020 年 12 月 30 日  
修订日期：2025 年 10 月 01 日



## 麦白霉素片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

### 【药品名称】

通用名称：麦白霉素片  
英文名称：Meleumycin Tablets  
汉语拼音：Maibaimeisu Pian

【成份】本品主要成份为麦迪霉素 A1， 吉他霉素 A6。

【性状】本品为糖衣片，除去包衣后，显白色或类白色片。

【适应症】主要适用于金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎球菌、白喉杆菌、支原体等敏感菌所致的呼吸道、皮肤、软组织、胆道感染和支原体性肺炎等。

【规格】0.1g(10 万单位)

【用法用量】口服，成人一日 0.8~1.2g，小儿按体重一日 30mg/kg，分 3~4 次服用。

【不良反应】1. 肝毒性：在正常剂量下本品的肝毒性较小，主要表现为胆汁淤积和暂时性氯基转移酶升高，一般停药后可恢复。2. 过敏反应：主要表现为药物热、药疹和荨麻疹等。3. 偶见恶心、呕吐、上腹不适、食欲不振等胃肠道反应。

【禁忌】对本品及大环内酯类药物过敏者禁用。

【注意事项】(1) 肝、肾功能不全者慎用。(2) 本品与其他大环内酯类药物之间有交叉耐药性。(3) 患者对本品过敏或不能耐受时，对其他大环内酯类药物也可过敏或不能耐受；如发生过敏反应，应立即停药，并对症处理。(4) 对诊断的干扰：本品可干扰 Higerty 法的荧光测定，使尿儿茶酚胺的测定值出现假性增高。血清碱性磷酸酶、胆红素、丙氨酸氨基转移酶和门冬氨酸氨基转移酶的测定值均可能增高。(5) 因不同细菌对本品的敏感性存在一定差异，故宜作药敏测定。(6) 本品在 pH $\geq$ 6.5 时吸收差。

【孕妇及哺乳期妇女用药】(1) 本品中某些组分可通过胎盘进入胎儿循环，浓度一般不高，目前也无对胎儿影响方面的报道，但孕妇服用本品时仍宜权衡利弊。(2) 本品中某些组分可进入母乳中，故哺乳期妇女服用本品时宜权衡利弊。

【儿童用药】尚不明确。

【老年用药】尚不明确。

**【药物相互作用】**本品可抑制茶碱的正常代谢，与茶碱合用时可致茶碱的血药浓度异常升高而致中毒，甚至死亡，故两药合用时应监测茶碱的血药浓度。

**【药物过量】**尚不明确。

**【药理毒理】**本品为链霉菌产生的一种多组分大环内酯类抗生素。抗菌性能与红霉素相似，对革兰阳性菌和支原体显示很强的抗菌作用，对部分革兰阴性菌如脑膜炎奈瑟菌、淋病奈瑟菌等亦有抗菌作用。部分耐红霉素的金黄色葡萄球菌对本品仍可敏感。本品通过作用于细菌核糖体的 50S 亚基，阻碍细菌蛋白质的合成而发挥作用，为生长长期抑菌药。

**【药代动力学】**本品口服吸收迅速，广泛分布于各器官中，肝、肺、脾、皮肤及口腔内浓度较高，胆汁中有很高浓度，尿中浓度很低。主要由胆汁随粪便排出。

**【贮藏】**密封，在干燥处保存。

**【包装】**口服固体药用高密度聚乙烯瓶，100 片/瓶。

**【有效期】**24 个月。

**【执行标准】**中国药典 2025 年版二部。

**【批准文号】**国药准字 H41025060

**【上市许可持有人】**海南制药厂有限公司制药二厂

**【地址】**林州市史家河工业园区

**【生产企业】**

企业名称：海南制药厂有限公司制药二厂

生产地址：林州市史家河工业园区

邮政编码：456592

电话号码：0372-6515111

传真号码：0372-6515111